

طَب

غذاهای فراوری شده منجر به بیماری التهاب روده می شوند



مهر: تحقیقات جدید نشان می دهد که خوردن مقادیر زیاد میان وعده و غذاهای فوق العاده فراوری شده می تواند خطر ابتلا به بیماری التهاب روده را افزایش دهد. غذاهای فوق العاده فراوری شده شامل مواد غذایی پخته شده بسته بندی شده، نوشیدنی‌های گازدار، غلات شیرین، وعده‌های غذایی آماده یا مواد افزودنی غذایی و مواد گوشتی و ماهی فراوری شده است.این محصولات اغلب حاوی مقادیر زیادی قند، چربی و نمک افزودنی هستند، اما میزان ویتامین و فیبر آن کم است.

محققان معتقدند که رژیم غذایی در بروز بیماری التهاب روده نقش دارد، اما اطلاعات محدودی در مورد ارتباط بین مصرف مواد غذایی فوق العاده فراوری شده و این بیماری که شامل بیماری کرون و کولیت روده است، وجود دارد.محققان دانشگاه مک مستر کانادا داده‌های بیش از ۱۱۶ هزار بزرگسال ۳۵ تا ۷۰ ساله را که در ۲۱ کشور کم درآمد، متوسط و پردرآمد زندگی می کردند، تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ ثبت نام شدند و حداقل هر سه سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. طی پیگیری متوسط ۱۰ ساله، ۴۶۷ شرکت کننده مبتلا به بیماری التهاب روده تشخیص داده شدند. پس از در نظر گرفتن سایر فاکتورها، محققان نتیجه گرفتند که مصرف مقادیر بیشتر غذای فراوری شده با خطر بالاتر التهاب روده همراه است.

به مقایسه با افرادی که کمتر از یک وعده غذای فوق العاده فراوری شده در روز مصرف می کردند، خطر ابتلاء به بیماری التهاب روده در بین کسانی که روزانه ۵ وعده یا بیشتر مصرف می کردند ۲۱درصد و در بین کسانی که روزانه یک یا چهار وعده مصرف می کنند ۶۷ درصد بیشتر است.

تاثیرات فشار خون بالا در بارداری

یک جراح و متخصص زنان گفت: برای پیشگیری از مسمومیت‌های بارداری حتماً فشار خون مادر باید قبل از بارداری کنترل شود.

شیرین نیرومنش جراح و متخصص زنان اظهار کرد: فشار خون بالا در بارداری از خطرهای جدی است که خانم‌های باردار را تهدید می کند و همچنین می‌تواند از علل شایع مرگ و میر مادران را برساند، بنابراین درمان و تشخیص به موقع آن بسیار اهمیت دارد. وی افزود: انواع فشار خون در دوران بارداری وجود دارد، یکی مربوط به خانم‌هایی است که قبل از بارداری دچار فشار خون مزمن هستند و با فشار خون بالا باردار می‌شوند که ممکن است مشکل عروقی حاملگی فشار خون تشدید شود یا افزایش پیدا کند و به مسمومیت‌های بارداری تبدیل شود زیاد است.او ادامه داد: مسمومیت بارداری با بالا رفتن فشار خون و دفع پروتئین از ادرار همراه است. این مسمومیت خطر جدی برای مادر دارد و می‌تواند به تدریج همه اعضای بدن را او را درگیر کند.

این جراح و متخصص زنان گفت: افرادی که قبل از بارداری به فشار خون مزمن دچار هستند و با فشار خون بالا باردار می‌شوند، بارداری خطرناکی دارند، همچنین در خانم‌هایی که در سن پایین‌تر باردار می‌شوند مسمومیت حاملگی شایع است. مادرانی که اولین تجربه بارداری را دارند هم ممکن است دچار این مشکل شوند و همچنین خانم‌هایی که بعد از سالگی ۳۵ باردار می‌شوند هم دچار مسمومیت حاملگی می‌شوند. نیرومنش اظهار کرد: برای پیشگیری از مسمومیت‌های ناشی از بارداری باید فشار خون، قبل از بارداری کاملاً کنترل شود و همچنین در دوران بارداری هم باید به طور مرتب فشار خون و مشکلات کلیوی بررسی شوند.

مطالعه و پازل، بیماری آلزایمر را ۵ سال به تعویق می اندازد



نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که ذهن فعال در دوران پیری می تواند بیماری آلزایمر را تا ۵ سال به تأخیر بیندازد.محققان می‌گویند فعالیت‌هایی مانند مطالعه، نوشتن نامه، و بازی پازل ممکن است باعث افزایش سلامت مغز حتی در افراد ۸۰ ساله شود.«رابرت ویلسون»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو، در این باره می‌گوید: «دلیل اصلی این است که فرد در حال پردازش اطلاعات بیشتر می‌شود.»وی گفت: «مطمئناً مطالعه مهم است، اما هر چیزی که ذهن را تحریک کند و از نظر فکری فرد را به چالش بکشد، می‌تواند مفید باشد.»ویلسون هشدار داد که این مطالعه نمی‌تواند اثبات کند که داشتن فعالیت ذهنی زوال عقل را به تأخیر می‌اندازد، اما نشان می‌دهد که مطالعه و فعالیت‌های مختلف شناختی ممکن است مفید باشد، اگرچه مطالعات دیگر نشان داده اند که ذهن فعال زوال عقل را به تأخیر می‌اندازد، اما این مطالعه یک بازه زمانی را برای تأخیر در دنیای واقعی مشخص کرده است.به گفته ویلسون، «هم اکنون برآوردهایی وجود دارد که تأخیر پنج ساله در بروز این بیماری می‌تواند تأثیر آن را ۴۰درصد در جمعیت کاهش دهد.»برای این مطالعه، تیم ویلسون داده‌های مربوط به حدود ۲۰۰۰ نفر با میانگین سنی ۸۰ سال را که در ابتدای مطالعه زوال عقل نداشتند، جمع آوری کرد.در طی هفت سال، شرکت کنندگان تست‌های ذهنی یا شناختی را انجام دادند.طی دوره پیگیری، ۴۵۷ نفر با میانگین سنی ۸۹ سال به آلزایمر مبتلا شدند. محققان دریافتند کسانی که بالاترین سطح فعالیت ذهنی را داشتند، در ۹۴ سالگی دچار زوال عقل شدند، ولی افراد با کمترین سطح فعالیت ذهنی، در ۸۹ سالگی دچار زوال عقل شدند.

ایسنا: نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی سلول‌های سرطان معده نشان داد که عصاره گیاه «برازمیل» می‌تواند تعداد سلول‌های سرطانی زنده را در محیط کشت کاهش دهد.

سرطان معده چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان است. درمان اصلی این بیماری در مراحل اولیه، جراحی است و رادیوتراپی و شیمی‌درمانی نیز در صورت نیاز به صورت تکمیلی انجام می‌شوند.با توجه به این‌که این درمان‌ها عوارض مختلفی را به همراه دارند، پژوهشگران به دنبال یافتن داروهای جدید با عوارض کم‌تر هستند.

بررسی گیاهان برای یافتن ترکیبات موثر، از جمله این اقداماتند؛ چرا که

ایسنا: نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی سلول‌های سرطان معده نشان داد که عصاره گیاه «برازمیل» می‌تواند تعداد سلول‌های سرطانی زنده را در محیط کشت کاهش دهد.

سرطان معده چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان است. درمان اصلی این بیماری در مراحل اولیه، جراحی است و رادیوتراپی و شیمی‌درمانی نیز در صورت نیاز به صورت تکمیلی انجام می‌شوند.با توجه به این‌که این درمان‌ها عوارض مختلفی را به همراه دارند، پژوهشگران به دنبال یافتن داروهای جدید با عوارض کم‌تر هستند.

تومور پانکواست نوعی سرطان ریه است که در قسمت فوقانی ریه رشد می‌کند و تا دنده ها، مهره‌ها، اعصاب و عروق خونی گسترش می‌یابد.

سرطان ریه در مراحل اولیه خود علانمی ندارد که قابل مشاهده یا احساس باشد و در مراحل بعد، اغلب باعث کمتر شناخته شده دیگری نیز در قسمت‌هایی از بدن ممکن است ظاهر شوند که انتظارش را ندارند، به ویژه اینکه این علانم فقط مربوط به سرطان ریه نیستند. در این گزارش برخی از این علانم و نشانه‌ها معرفی می‌شوند:

۱- بروز چربی در اطراف انگشتان

برخی از تومورهای ریه باعث تولید مواد شیمیایی

شبه هورمونی در بدن می‌شوند که یکی از آن‌ها باعث می‌شود خون و مایعات بیشتری در نوک و اطراف

انگشتان به داخل بافت‌ها رانده شود و ضخیم‌تر یا بزرگتر

از حد معمول به نظر برسند. در این حالت پوست کنار ناخن‌ها براق به نظر می‌رسد، یا ممکن است ناخن‌ها

بیشتر از حد معمول وقتی از پهلو مشاهده می‌شوند،

انحنا پیدا کنند. گرچه این‌ها علانم شایعی نیستند، اما

ارتباط نزدیکی با سرطان ریه دارند، به گونه‌ای که حدود

۸۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان ریه انگشتان متورم

خواهند داشت.

۲- هیپرکلسمی

حدود ۲۰ درصد بیماران سرطانی دارای سطح

کلسیم بالا هستند، بیماری را به نام هیپرکلسمی که

می‌تواند باعث درد شکم همراه با حالت تهوع یا بی‌وست،

کاهش اشتها و تشنگی شدید شود. سرطان باعث می‌شود

ماده شیمیایی مشابه هورمون که توسط برخی تومورها

ساخته می‌شود، به کلیه‌ها آسیب برساند و باعث گرفتگی

و حالت تهوع شود.

۳- مشکلات بهداشت روان

در یک مطالعه دانمارکی، افرادی که یکسال قبل از آن مشکلات روانی از استرس گرفته تا افسردگی و

زوال عقل داشتند، بیشتر مبتلا به سرطان ریه بودند. این

می‌تواند نتیجه چگونگی تأثیر سرطان بر سیستم ایمنی

بدن یا هورمون‌ها باشد. سطح بالای کلسیم مرتبط با

سرطان همچنین می‌تواند باعث سردگمی، تفکر گمراه

شده و افسردگی شود.


۴- درد کم‌ر یا شانه

تاثیر عصاره یک گیاه بومی در کاهش سلول‌های سرطان معده

گیاهان قرن‌ها منبع اصلی کشف داروهای مختلف بوده‌اند و داروهای ضد سرطان مختلفی با استفاده از ترکیبات گیاهی ساخته شده است. خانواده گیاه دارویی Provskia که از تیره نمناع هستند، با نام‌های بومی «دومو»، «برازمیل» و یا «گوره» شناخته می‌شوند. از این گیاه برای تسکین دردهای روماتیسمی، رفع التهاب، دفع انگل و ... استفاده می‌شود.

برخی پژوهش‌ها نشان داده که ترکیبات موجود در این گیاه خاصیت ضد توموری و ضد سرطانی نیز دارد. بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سمنان با انجام یک تحقیق، تأثیر عصاره گیاه Perovskia abrotanoides یا برازمیل را بر سلول‌های سرطان معده بررسی کردند.

علائم غیرمنتظره سرطان ریه



تومور پانکواست نوعی سرطان ریه است که در قسمت فوقانی ریه رشد کرده و به دنده‌ها، مهره‌ها، اعصاب و عروق خونی گسترش می‌یابد. به دلیل محل رشد این تومورها، بندرت بر سیستم تنفسی تأثیر می‌گذراند و به احتمال زیاد باعث درد شانه، قسمت فوقانی کمر و بازو می‌شوند.

۵- خستگی

تعداد کم گلبول‌های قرمز یا کم خونی، یک اثر

بسیار شایع سرطان ریه است. کم خونی می‌تواند بیمار را

خسته کند، زیرا بافت‌های بدن او اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنند. به طور کلی، سلول‌های سرطانی باید از مواد

کفندی که این بافت نوسان وضع جسمی بیمار می‌شود،

۶- عدم تعادل و ثبات

سرطان ریه به سیستم ایمنی بدن می‌گوید که به سیستم عصبی حمله کند و ممکن است بر عملکرد

عضلات تأثیر بگذارد. ایستادن از حالت نشسته دشوارتر می‌شود و یا ممکن است بیمار احساس ناپایداری کند.

اگر تومور در ریه فوقانی راست باشد، ممکن است در اثر کم خونی یا به دلیل باریک شدن ورید اجوف فوقانی

(ورید بزرگی که خون را از سر به قلب می‌برد) دچار

۷- تغییر در وزن بدن

برخی از افراد مبتلا به سرطان ریه به سندرمد

کوشینگ مبتلا می‌شوند که در آن سلول‌های سرطانی

بسته به موقعیت آن، تومور می‌تواند ورید اجوف

ناشی از تومور سرطانی بر روی آن خفه می‌شود، خون از

قسمت‌های بالای بدن به کندی جریان می‌یابد و باعث تورم گردن، بازوها و صورت به دلیل تجمع مایعات اضافی

در انتظار دفع می‌شود. این ممکن است منجر به ایجاد لکه‌هایی در قفسه سینه با رنگ قرمز شود که مایل به

آبی است.

۱۲- تورم صورت، گردن یا بازوها

هنگامی که ورید اجوف فوقانی به دلیل فشار

ناشی از تومور سرطانی بر روی آن خفه می‌شود، خون از

قسمت‌های بالای بدن به کندی جریان می‌یابد و باعث تورم گردن، بازوها و صورت به دلیل تجمع مایعات اضافی

در انتظار دفع می‌شود. این ممکن است منجر به ایجاد لکه‌هایی در قفسه سینه با رنگ قرمز شود که مایل به

آبی است.

۱۳- ضعف و درد

وقتی سرطان ریه در بدن گسترش می‌یابد، سلول‌ها

اغلب از طریق جریان خون به استخوان‌ها می‌روند و تومورها با ضایعات جدیدی ایجاد می‌کنند. این تومورها

اغلب به استخوان‌ها آسیب می‌رسانند و باعث شکنندگی و

دردناک‌تر شدن آن‌ها می‌شوند. بیمار ممکن است دچار عدم تعادل مواد معدنی شود، علاوه بر این، هایپرکلسمی

بدن می‌شود. اگر سرطان بر سیستم عصبی تأثیر بگذارد، ممکن است منجر به ضعف عضلانی شود که باعث می‌شود فرد در گفتار یا بلع دچار مشکل شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

برای انجام این مطالعه ابتدا گیاه برازمیل از منطقه ییلاقی پرور شهرستان سمنان جمع‌آوری و پس از خشک شدن، فرآیند عصاره‌گیری از آن انجام شد. برای بررسی قدرت آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی این گیاه، عصاره به محیط کشت سلول‌های سرطانی ادنوکارسینومای معده انسان (MKN۴۵) افزوده شد.

مشاهدات پژوهشگران حاکی از این بود که عصاره گیاه برازمیل می‌تواند به شکل معنی‌داری سلول‌های زنده سرطانی را کاهش دهد و با گذشت زمان و افزایش غلظت، زنده‌مانی سلول‌های سرطانی به طور معنی‌دار کاهش بیشتری یافته است.

فوقانی را فشرده کند که این امر عبور خون از آن را دشوار می‌کند و در نتیجه باعث سردرد می‌شود و سطح بالای کلسیم باعث سردردهای متناوب می‌شود؛ بنابراین، باید آزمایش‌های لازم برای تشخیص هرگونه سردرد جدید، غیرمعمول یا تغییر الگوی حملات سردرد انجام شود.

۱۱- مشکلات قلبی

هیپرکلسمی و کم خونی می‌توانند علانمی مانند

ضربان قلب سریع یا نامنظم ایجاد کنند. اگر مشکلات

قلبی ناشی از هیپرکلسمی باشد، احتمالاً شدید خواهد

بود و یک بیمار مبتلا به سرطان ریه ممکن است دچار

حمله قلبی یا کما شود. کم خونی شدیدی همچنین

می‌تواند باعث درد قفسه سینه و تنگی نفس شود.

۱۲- تورم صورت، گردن یا بازوها

هنگامی که ورید اجوف فوقانی به دلیل فشار

ناشی از تومور سرطانی بر روی آن خفه می‌شود، خون از

قسمت‌های بالای بدن به کندی جریان می‌یابد و باعث تورم گردن، بازوها و صورت به دلیل تجمع مایعات اضافی

در انتظار دفع می‌شود. این ممکن است منجر به ایجاد لکه‌هایی در قفسه سینه با رنگ قرمز شود که مایل به

آبی است.

۱۳- ضعف و درد

وقتی سرطان ریه در بدن گسترش می‌یابد، سلول‌ها

اغلب از طریق جریان خون به استخوان‌ها می‌روند و تومورها با ضایعات جدیدی ایجاد می‌کنند. این تومورها

اغلب به استخوان‌ها آسیب می‌رسانند و باعث شکنندگی و

دردناک‌تر شدن آن‌ها می‌شوند. بیمار ممکن است دچار عدم تعادل مواد معدنی شود، علاوه بر این، هایپرکلسمی

بدن می‌شود. اگر سرطان بر سیستم عصبی تأثیر بگذارد، ممکن است منجر به ضعف عضلانی شود که باعث می‌شود فرد در گفتار یا بلع دچار مشکل شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

این لخته‌ها مشخص نیست. ممکن است که سرطان باعث التهاب شدن ریه‌ها باشد که منجر به ریزه لخته شدن

شود یا شاید مواد شیمیایی موجود در تومور باعث ایجاد

لخته شود.

۱۴- لخته شدن خون

یک بیمار مبتلا به سرطان ریه به احتمال زیاد به

لخته شدن خون در پاها یا بازوها (به نام ترومبوز ورید عمقی) و ریه‌ها (آمبولی ریه) مبتلا می‌شود. علت دقیق

</